

MSMILINE CLINIC **CHIRURGIES BUCCALES**

LIRE ATTENTIVEMENT: LES DIRECTIVES POSTOPERATOIRES SONT TRES IMPORTANTES UNE SIMPLE NEGLIGENCE DE VOTRE PART PEU RETARDER LA GUERISON ET CONDUIRE A UN ECHEC DU TRAITEMENT.

POUR LES PREMIERES 24 HEURES:

1. Pendant deux heures, maintenir le tampon de gaz par une légère pression des dents ou des mâchoires.
2. En cas de saignement prolongé, poursuivre le même traitement ou remplacer le tampon pas un sac de the humide.
3. Lorsque vous êtes étendu ou lorsque vous dormez, veuillez soutenir la tête au moyen de 2 ou 3 oreillers.
4. Appliquer un sac de glace sur le visage pendant 20 min. puis retirez-le pour 10 min. répétez le traitement pour les premiers 24 heures.
5. Ne pas manger ou boire pour les 2 heures qui suivent l'opération
6. Votre alimentation doit être restreinte à une diète liquide froide. Ne pas utiliser de paille.
7. Ne pas rincer votre bouche, ni brosser ou cracher pour les premières 24 heures.
8. Si les prothèses ont été immédiatement remplacé après la chirurgie alors veuillez les conserver en place et les enlever a toutes les 24 hrs pour les rincer et pour nettoyer votre bouche tel indique.
9. Si vous avez les lèvres gercées, vous pouvez utiliser de la vaseline.
10. Ne pas fumer (fumer peu retarder la guérison, entrainer de l'infection, de l'enflure et conduire a un échec le traitement.)
11. Aucun sumenage.

LES JOURS SUIVANTS :

1. Après le repas, brosser délicatement les dents en exduant l'endroit opéré et les points de suture.
2. Ajouter 1 a 2 c. a the de sel dans un verre d'eau tiède et utilisez pour rincer l'endroit opéré (Si on vous a prescrit du Peridex alors mettre 1 a 2 c. a the dans un verre d'eau tiède et rincez 3 fois par jour). Après rinçage, veuillez laisser l'eau salée ou le Peridex couler hors de la bouche sans cracher. Ne pas utilise du rince bouche alcoolise.
3. Appliquer des compresses chaudes et humides sur les régions enflées au visage.
4. Pendant les deux premières semaines, la diète doit être molle. (purée)
5. Les points de sutures sont résorbables après une ou deux semaines environ. S'il devait durée plus de 3 semaines alors veuillez revenir à la clinique pour les faires enlever.

LES SYMPTOMES SUIVANTS PEUVENT NORMALEMENT SE MANIFESTER :

Enflure : plus prononcée les 2e et 3e jours suivant l'opération, elle diminuera par la suite.

Décoloration : bleu, noire ou jaune, elles peuvent apparaître à certain endroits. Ce ne sont pas des ecchymoses mais les résultats du saignement des tissus et selles sont importance.

Saignement : très léger, il peu durer quelques jours.

A la moindre complication ou pour des questions, SVP communiquer immédiatement avec nous au 514-695-8641